42 ~~Rapport~~ Description Anatomique dun demie Acephale que jay eu Lhonneur de vous presenter Le 22 aoust dernier. (Lecture unique jugée suffisante)

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

ayant eté appelé ce meme jour au Matin ~~quartier~~ st jacque par une sage femme pour Laider a terminer un accouchement qui Luy paroisoit tres difficile, je reconnû que Lenfant presentoit La face deja fort tumefié et avancé entre Les deux detroits demaniere que je ne crû pas devoir emploier dautre moien que de provoquer et rappeler par delegeres titillations Les douleurs qui etoient foibles, et dont Le seul defaut retardoit La sortie du fœtus; javois remarqué en faisant Lexamen de sa situation, un afaisement total du casque osseux, au lieu du quel je rencontrois une Tumeur molle quil m eut eté facile depenetrer ce dont je me donnay de garde, et qui me fut une raison de plus pour abandonner, autant que faire ce pouroit, cet accouchement aux efforts de la Nature

on effet

ARC 26 n° 46
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

en effet, avec un peu d'aide, j'eu La satisfaction dans Lespace d'une heure de Le voir se terminer, pour ainsy dire, de luy meme, a quelque peines pres que j'eu pour degager Les Epaules, par Le peu de dilatation que cet tete ainsy tronqué avoit fait sur Les parties.

La premiere inspection me fit reconnoitre ce vice de conformation pour ce que Nous appelons demie Acephale.

par La dissection qui en a eté faite, nous avons remarqué 1°. que Le fongûs d'une consistance assé molle, et d'un rouge brun qui occupoit Le sommet de La tete, netoit qu'une substance Membraneuse, renfermant quantité d'hydatides, entre autres deux assé considerables; sous ce fongûs qui netoit vraysemblablement que Les Debris des teguments des muscles et des Membranes dont il Paroisoit

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

faire une continuité, il ne s'est trouvé que quelque petits vestiges des parietaux a leurs jonction avec les temporaux. Le coronal nexiste que dans la partie inferieur. toute la partie superieur de l'occipital manque, et ce quil reste de tous ces os se trouvent contourné endedans et aplati sur les cotés de la base du crane. nulle aparence de la substance du cerveau. Les nerfs optiques sembloient partir de la portion dela dure mere qui recouvre le sphenoïde. La tente du cervelet etoit en partie detruite, et comme dechiqueté; et il ne restoit de ce viscere qu'une portion dela grosseur d'une tres petite feve d'ou partoit cependant la substance medullaire ou la moelle allongé. —

du reste cet enfant etoit bien formé et avoit dija deux dents molaires renfermés dans leurs alveoles.

Ramenet

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE